

SKORDÝR Í TRJÁM OG RUNNUM

Samantekt:

Edda S. Oddsdóttir

Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá

Bæklingur þessi er eingöngu hugsaður sem stutt samantekt, að mestu byggð á myndum, af helstu skaðvöldum sem finnast á trjám og runnum á Íslandi. Listinn er ekki tæmandi.

Samantektin er að miklu leyti unnin upp úr þödduvef Náttúrufræðistofnunar Íslands (www.ni.is). Þaðan eru útbreiðslukortin sem sýna fundarstaði einstakra tegunda og talsvert af ljásmyndum. Einnig er leitað fanga í myndasafni starfsmanna Mógilsár og á netinu eftir þörfum. Reynt er að geta þess hvaðan myndirnar eru.

Áhugasönum er bent á að leita sér frekari upplýsinga, t.d. í bók Guðmundar Halldórssonar og Halldórs Sverrissonar, Heilbrigði trjágróðurs, sem gefin var út 2014.

Barrvefari — *Zeiraphera griseana*; Larch Bud Moth

Flugtími frá lokum júlí, lirfur á barrtrjám fyrri hluta sumars




Ljósm. Erling Ólafsson



UGA2101036



Ljósm. Halldór Sverrisson



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/zeiraphera/zeiraphera_griseana

Birkifeti—*Rheumaptera hastata*; Spear-Marked Black Moth

Flugtími fyrri hluta sumars, einkum í júní og júlí

Lirfur ná fullum vexti í ágúst



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir




Ljósm. Erling Ólafsson



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir


http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/rheumaptera/rheumaptera_hastata



Birkikemba— *Heringocrania unimaculella*: Micromoth
Flugtími á vorin, fiðrildið horfið um miðjan maí
Lirfur lifa inni í birkiblöðum



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/eriocranoidea/eriocraniidae/heringocrania/heringocrania_unimaculella



Birkivefari — *Acleris notana*

Flugtími er frá vorleysingum og fram eftir júní, hámark apríl/maí. Svo aftur
að hausti
Lirfur í júní/júlí



Ljósm. Erling Ólafsson



www.lepiforum.de




Ljósm. Erling Ólafsson



www.lepiforum.de

[http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/
tortricidae/acleris/acleris_notana](http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/acleris/acleris_notana)



Haustfeti - *Operophtera brumata*; Winter Moth

Flugtími á haustin, sept– nóvember

Lirfur fyrrí part sumars



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir

Ljósm. Erling Ólafsson




Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/operophtera/operophtera_brumata





Lyngfeti — *Eupithecia nanata*; The Narrow-winged Pug

Flugtími júní-ágúst


Ljósm. Erling Ólafsson



www.lepiforum.de



www.lepiforum.de



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/eupithecia/eupithecia_nanata

Möðrufeti - *Eprrhoe alternata*; White-banded Toothed Carpet Moth

Flugtími júní-júlí




Ljósm. Erling Ólafsson



www.lepiforum.de



www.lepiforum.de



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/epirrhoe/epirrhoe_alternata

Víðifeti — *Hydriomena furcata*;

The July Highflyer


Flugtími júlí-september

Lirfur fyrri hluta sumars



Ljósm. Erling Ólafsson

[http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/
hydriomena/hydriomena_furcata](http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/hydriomena/hydriomena_furcata)



Mófeti - *Eupithecia satyrata*; The Satyr Pug

Flugtími maí-júlí

Lirfur frá júní

Ljósm. Erling Ólafasson

Ljósm. Edda S. Oddsdóttir

Ljósm. Edda S. Oddsdóttir

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/eupithecia/eupithecia_satyrata

Tígulvefari — *Epinotia solandriana*;

Birch Leafroller

Flugtími seinni hluta júlí fram í miðjan
október

Lirfur vaxa upp fyrri hluta sumars,
spinna saman lauf birkis




Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/epinotia/epinotia_solandriana




Ertuygla — *Melanchra pisi*; Broom Moth

Flýgur í maí og júní

Lirfur í júlí og ágúst



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/melanchra/melanchra_pisi





Brandygla – *Euxoa ochrogaster*: Red-backed Cutworm)


Flygur frá byrjun júlí til loka september,
algengust um miðjan ágúst

Lirfur vaxa fyrri hluta sumars

Ljósm. Erling Ólafsson



Ljósm. Guðmundur Halldórsson




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/euxoa/euxoa_ochrogaster

Asparglytta – *Phratora vitellinae*
Fullorðnar bjöllur frá miðjum apríl
Lirfur upp úr miðjum júní



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/chrysomeloidea/chrysomelidae/phratora/phratora_vitellinae



Rifsþéla —*Nematus ribesii*
Lirfur í júní-ágúst
Fullorðin dýr byrjun júlí-nóvember



Ljósm. Erling Ólafsson




Ljósm. Erling Ólafsson




Ljósm. Erling Ólafsson

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/hymenoptera/tenthredinoidea/tenthredinidae/nematus/nematus_ribesii



Silakeppur —*Otiorhynchus arcticus*

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/otiorhynchus/otiorhynchus_arcticus




Ljósm. Halldór Sverrisson



Ljósm. Erling Ólafsson.

Ranabjöllur eru samheiti nokkurra tegunda, en silakeppur og hélukeppur eru algengastir. Fullorðnu dýrin lifa á laufum en lirfurnar á rótum og geta verið miklir skaðvaldar í nýgróðursetningum




Hélukeppur —*Otiorhynchus nodosus*

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/otiorhynchus/otiorhynchus_nodosus

Ljósm. Erling Ólafsson



Ljósm. Bjarni Diðrik Sigurðsson



Víðirani (Dorytomus taeniatus)

Bjöllur naga laufblöð, miðjum apríl—júní
Lirfur grafa sig í rekla og laufblöð frá júní
fram í júlí

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/dorytomus/dorytomus_taeniatus

Ljósm. Erling Ólafsson




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/otiorhynchus/otiorhynchus_singularis

Ljósm. Erling Ólafsson

Skógbursti —*Orgyia antiqua*
Lirfur finnast í júní-júlí
Fullorðin dýr í júlí-september




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/lymantriidae/orgyia/orgyia_antiqua





Ljósm. Erling Ólafsson

Ljósm. Erling Ólafsson



Spánarsnigill — *Arion lusitanicus*

Finnst í húsagörðum, gróðrarstöðvum og víðar. Liggur í dvala yfir veturinn, mikið átvagn og getur orðið allt að 15cm.

Mikilvægt er að sporna gegn landnámi spánarsnigils eins og frekast er unnt og skal því tortíma þeim sniglum sem ekki gefst kostur á að skila til Náttúrufræðistofnunar

Jarðygla — *Diarsia mendica*; The Ingrailed Clay

Flugtími í júní og júlí


Lirfur í júlí og fram á haust



Ljósm. Erling Ólafsson



[http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/
lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/diarsia/diarsia_mendica](http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/diarsia/diarsia_mendica)



Skrautfeti — *Dysstroma citrata*; The Dark Marbled Carpet eða Northern Marbled Carpet

Flugtími júlí-sept

Lirfa fyrri part sumars,
lifir á lyngi, birki o.fl.



bugguide.net




Ljósm. Erling Ólafsson

Túnfeti - *Xanthorhoe decoloraria*; The Red Carpet

Flugtími maí/júní-loka ágúst



Ljósm. Erling Ólafsson




Grasyglá — *Cerapteryx graminis*; The Antler Moth

Flugtími frá seinni hluta júní og fram í september



Ljósmynd: Erling Ólafsson



[http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/cerapteryx/
cerapteryx_graminis](http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/cerapteryx/cerapteryx_graminis)


Kjarrvefari - *Apotomis sororculana*

Flugtími júní júlí

Lirfur júlí -



www.lepiforum.de



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/apotomis/apotomis_sororculana

Ljósm. Erling Ólafsson

Grasvefari - *Eana osseana*; Eana Grass Tortrix Moth

Flugtími frá miðjum júní



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/eana/eana_osseana

Ljósm. Erling Ólafsson

Furubéla (*Acantholyda erythrocephala*)

Fullorðin dýr verpa í byrjun sumars, lirfur éta
nálar fram á mitt sumar



[http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/hymenoptera/pamphilioidea/pamphiliidae/acantholyda/
acantholyda_erythrocephala](http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/hymenoptera/pamphilioidea/pamphiliidae/acantholyda/acantholyda_erythrocephala)



Beltasveðja — *Urocerus gigas*

Slæðingur með ýmiss konar timbri en
hefur fundist í trjából sem felldur var á
Mógilsá 2011



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/hymenoptera/siricidae/urocerus/urocerus_gigas

