

Skordýr í trjám og runnum

Samantekt:

Edda S. Oddsdóttir

Mógilsá, rannsóknasvið Skógræktarinnar

Bæklingur þessi er eingöngu hugsaður sem stutt samantekt, að mestu byggð á myndum, af helstu skaðvöldum sem finnast í trjám og runnum á Íslandi. Ekki er um tæmandi lista að ræða.

Samantektin að miklu leyti byggð á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands, ni.is. Þaðan eru útbreiðslukortin sem sýna fundarstaði einstakra tegunda og talsvert af ljósmyndum. Einnig er leitað fanga í myndasafni starfsmanna Mógilsár og á netinu eftir því sem þörf var. Reynt er að geta þess hvaðan myndirnar eru.

Áhugasömum er bent á að leita sér frekari upplýsinga, t.d. í bók Guðmundar Halldórssonar og Halldórs Sverrissonar, Heilbrigði trjágróðurs, sem gefin var út 2014.



skógræktin

Barrvefari (*Zeiraphera griseana*); Larch Bud Moth
Flugtími frá lokum júlí, lirfur á barrtrjám fyrri part sumars




Ljósm. Erling Ólafsson



UGA2101036



Ljósm. Halldór Sverrisson




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/zeiraphera/zeiraphera_griseana

Birkifeti (*Rheumaptera hastata*); Spear-Marked Black Moth

Flugtími fyrri partur sumars, einkum júní og júlí

Lirfur ná fullum vexti í ágúst



Birkikemba - (*Heringocrania unimaculella*): Micromoth
Flugtími á vorin, fiðrildi horfið um miðjan maí. Lirfur
lifa inni í birkiblöðum




Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/ericroanioidea/ericroaniidae/heringocrania/heringocrania_unimaculella

Birkivefari - (*Acleris notana*)

Flugtími er frá hlánun og fram eftir júní, hámark apríl/maí.
Svo aftur að hausti. Lirfur í júní/júlí



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/acleris/acleris_notana

Haustfeti - (*Operophtera brumata*); Winter Moth

Flugtími á haustin, sept-nóvember

Lirfur fyrri part sumars



Ljós. Edda S. Oddsdóttir




Ljós. Erling Ólafsson



Ljós. Edda S. Oddsdóttir



Ljós. Edda S. Oddsdóttir




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/operophtera/operophtera_brumata



Lyngfeti - (*Eupithecia nanata*); The Narrow-winged Pug

Flugtími júní-ágúst

Ljósni Erling Ólafsson




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/eupithecia/eupithecia_nanata

Möðrufeti - (*Epirrhoe alternata*); White-banded Toothed Carpet Moth

Flugtími júní-júlí



www.lepiforum.de



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/epirrhoe/epirrhoe_alternata


Víðifeti - (*Hydriomena furcata*);
The July Highflyer
Flugtími júlí-september
Lirfur fyrri hluta sumars (júní)



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Erling Ólafsson




http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/hydriomena/hydriomena_furcata

Mófeti - (*Eupithecia satyrata*); The Satyr Pug

Flugtími maí-júlí

Lirfur frá júní



Ljósm. Erling Ólafsson



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/geometroidea/geometridae/eupithecia/eupithecia_satyrata

**Tígulvefari - (*Epinotia solandriana*);
Birch Leafroller**

Flugtími seinni part júlí fram í
miðjan október

Lirfur vaxa upp fyrri part sumars,
spinna saman lauf birkis



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ertuygla - (*Melanchra pisi*); Broom Moth

Flýgur í maí og júní

Lirfur í júlí og ágúst



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Erling Ó



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/melanchra/melanchra_pisi



Ljósm. Erling Ólafsson

**Brandygla -
(*Euxoa ochrogaster*);
Red-backed Cutworm**

Flýgur frá byrjun júlí til
loka september, algeng-
ust um miðjan ágúst


Lirfur vaxa fyrri hluta
sumars



Ljósm. Guðmundur Halldórsson



© Ken Gray Insect Image Collection



Asparglytta - (*Phratora vitellinae*)

Fullorðnar bjöllur frá miðjum apríl

Lirfur upp úr miðjum júní


Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Brynja Hrafnkelsdóttir



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/chrysomeloidea/chrysomelidae/phratora/phratora_vitellinae

Rifspéla - (*Nematus ribesii*)

Lirfur í júní-ágúst

Fullorðin dýr byrjun júlí-nóvember



Ljósm. Erling Ólafsson



Ljósm. Erling Ólafsson




Ljósm. Erling Ólafsson



Silakeppur - (*Otiorhynchus arcticus*)

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/otiorhynchus/otiorhynchus_arcticus



Ljós. Halldór Sverrisson



Ljós. Erling Ólafsson

Ranabjöllur eru samheiti nokkurra tegunda, en af þeim eru silakeppur og hélukeppur algengastir. Fullorðnu dýrin lifa á laufum en lirfurnar á rótum og geta verið miklir skaðvaldar í nýgróðursetningum

Hélukeppur - (*Otiorhynchus nodosus*)



Ljós. Erling Ólafsson

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/otiorhynchus/otiorhynchus_nodosus



Víðirani -

(*Dorytomus taeniatus*)

Bjöllur naga laufblöð frá miðjum apríl fram í júní

Lirfur grafa sig í rekla og laufblöð frá júní fram í júlí

Ljósm. Erling Ólafsson



Ljósm. Bjarni Diðrik Sigurðsson

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/dorytomus/dorytomus_taeniatus

Trjákeppur - (*Otiorhynchus singularis*)

Fullorðin dýr á ferli frá vori og langt fram eftir hausti/vetri

Nagar brum, bök, blöð eða barr á trjám

Lirfurnar éta rætur



Ljósm. Erling Ólafsson

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/coleoptera/curculionidae/otiorhynchus/otiorhynchus_singularis

Skógbursti - (*Orgyia antiqua*)

Lirfur finnast í júní-júlí

Fullorðin dýr júlí-september



Ljósni Erling Ólafsson



Ljósni Erling Ólafsson



Ljósni Erling Ólafsson





Ljós. Erling Ólafsson



Ljós. Erling Ólafsson

Spánarsnigill - (*Arion lusitanicus*)



Finnst í húsagörðum, gróðrarstöðvum og víðar. Liggur í dvala yfir veturinn, mikið átvagl og getur orðið allt að 15 cm. Mikilvægt er að sporna gegn landnámi spánarsnigils eins og frekast er unnt og skal því tortíma þeim sniglum sem ekki gefst kostur á að skila til Náttúrufræðistofnunar

Jarðygla - (*Diarsia mendica*); The Ingrailed Clay
Flugtími í júní og júlí
Lirfur í júlí og fram á haust




Ljós. Erling Ólafsson



© Jim Porter

http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/noctuoidea/noctuidae/diarsia/diarsia_mendica



Skrautfeti - (*Dysstroma citrata*); The Dark Marbled Carpet eða Northern Marbled Carpet

Flugtími júlí-sept

Lirfa fyrri part sumars, lifir á lyngi, birki o.fl.



bugguide.net



Ljósm. Erling Ólafsson



Túnfeti - (*Xanthorhoe decoloraria*); The Red Carpet
Flugtími maí/júní til loka ágúst

Ljósm. Erling Ólafsson





Grasygla - (*Cerapteryx graminis*); The Antler Moth
Flugtími frá seinni hluta
júní og fram í september



Ljosm. Erling Ólafsson



Kjarrvefari -

(*Apotomis sororculana*)

Flugtími júní-júlí

Lirfur júlí -



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/apotomis/apotomis_sororculana

Ljós. Erling Ólafsson

Grasvefari - (*Eana osseana*);

Eana Grass Tortrix Moth

Flugtími frá miðjum júní



http://www.ni.is/animalia/arthropoda/hexapoda/insecta/lepidoptera/tortricoidea/tortricidae/eana/eana_osseana

Furupéla (*Acantholyda erythrocephala*)

Fullorðin dýr verpa í byrjun sumars, lirfur éta nálar fram á mitt sumar





Ljósm. Erling Ólafsson

Beltasveðja (*Urocerus gigas*)
 Slæðingur með ýmiss konar timbri
 en hefur fundist í trjábol sem
 felldur var á Mógilsá 2011



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir



Ljósm. Edda S. Oddsdóttir

